

IMIDASECT ANTS

Isco em gel (GL) contendo 0,01% (p/p) de imidaclopride
Autorização de venda PT/DGS ARMPB-07/2017 concedida pela DGS

INSECTICIDA DE USO DOMÉSTICO CONTRA FORMIGAS

CARACTERÍSTICAS

IMIDASECT ANTS é um insecticida pronto-a-usar destinado ao público em geral, indicado para o controlo de formigas em instalações domésticas (incluindo cozinhas), locais de processamento e confecção de alimentos (matadouros, restaurantes, cozinhas industriais), locais de armazenamento (armazéns, lojas, silos (excepto de grão armazenado)) e edifícios públicos (hospitais, hotéis, sanitários públicos, igrejas, cinemas, etc.).

IMIDASECT ANTS é um isco em gel com imidaclopride na sua formulação, que actua por ligação aos neurónios causando distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos dos insectos, o que se torna letal. Em condições normais, o gel mantém-se activo e palatável durante pelo menos dois meses.

As formigas são atraídas pelos nutrientes do gel/isco. Estas espalham o gel contaminando os seus pares, causando envenenamento (por contacto e ingestão) e morte de todos os indivíduos em apenas alguns dias, independentemente do estágio de desenvolvimento (ovos, larvas, ninfas, pupas e adultos).

IMIDASECT ANTS está recomendado no combate à formiga faraó (*Monomorium pharaonis*) e formiga argentina (*Linepithema humile*).

MODO DE EMPREGO

Antes do tratamento, remova o máximo possível de todas as fontes atractivas de alimentos para as formigas (restos de comida, migalhas, etc.) da área infestada, de modo a estimular a ingestão do gel.

Colocar gotas de gel ou linhas finas de gel junto aos carreiros das formigas, pontos de entrada e ninhos.

Verificar a área tratada uma vez por semana e se necessário, recarregar o gel.

Quando a presença de formigas é esporádica, é recomendado o uso do gel numa placa de isco.

A aplicação em exterior apenas deve ser feita em superfícies pavimentadas e não no solo.

DOSES DE APLICAÇÃO

- Aplicação interior: 1-2 gotas de gel por m². Aplicar gotas de gel com um 1 cm de diâmetro.
- Aplicação exterior: 1 gota de gel aplicada directamente na entrada do ninho ou 1 gota por cada metro linear nos carreiros das formigas para tratamento do perímetro. Aplicar gotas de gel com um 1 cm de diâmetro.

O produto pode ser usado continuamente durante 2 a 3 meses sem substituição do gel não consumido. Máximo de 12 aplicações por ano.

Nota: 1 gota de gel com aproximadamente 1 cm de diâmetro equivale a 0,2 g de produto comercial, pelo que uma embalagem com 5g de permite tratar 12,5 a 25 m² de área infestada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Não aplicar o produto em superfícies absorventes.

Aplicar o produto afastado da luz solar directa e de fontes de calor (aquecedores).

Evite o uso contínuo do produto. Se a infestação persistir apesar de ter seguido as instruções do rótulo, contactar com um aplicador profissional.

Informar o seu distribuidor se o tratamento não for eficaz.

A validade do produto é de dois anos após fabrico.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO

Evitar contacto desnecessário com a preparação. O manuseamento pode ser prejudicial á saúde.

Não contaminar alimentos, utensílios de cozinha ou superfícies de contacto com alimentos.

Não aplique o gel em locais acessíveis a crianças e animais de estimação.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com a pele, lavar com água abundantemente.

Se houver irritação da pele ou erupção: recorrer ao aconselhamento/cuidado médico. Tratamento sintomático.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Tel.: 808250143

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA



H411 Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

P201 Manter fora do alcance das crianças

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com a pele, lavar com água abundantemente.

Se houver irritação da pele ou erupção: recorrer ao aconselhamento/cuidado médico. Tratamento sintomático.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Tel.: 808250143

EMBALAGENS

Embalagem tipo seringa com 5 g de gel.

IMIDASECT ANTS é um produto de Sharda Europe B.V.B.A. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda.

Use biocidas com precaução. Antes de usar leia o rótulo.

Respeitar os usos, doses, condições e precauções indicados no rótulo, cuja determinação se baseou nas características do produto e nas condições de aplicação para qual é recomendado.

O tratamento deve ser efectuado de acordo com as boas práticas tendo em conta que é da responsabilidade do aplicador todos os factores que podem ser envolvidos e estão fora do nosso controlo (materiais usados, condições de aplicação, misturas, etc.).

O fabricante garante apenas a qualidade do produto vendido na embalagem original.