

# ALFIL WG

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 80% (p/p) de fosetil-alumínio  
 Autorização de Venda n.º 0291 concedida pela DGAV

## Fungicida sistémico para combate a fungos do género *Phytophthora*

### MODO DE AÇÃO

O ALFIL WG é um produto com base em fosetil-alumínio, um fungicida sistémico com mobilidade ascendente e descendente, que assegura a proteção das plantas à medida que estas se desenvolvem.

A sua ação é essencialmente preventiva, atuando através do estímulo das defesas fisiológicas das plantas, muito embora apresente também uma ligeira ação curativa direta sobre o agente patogénico.

### UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Concentração	Recomendações	Int. Seg. (dias)
Citrinos	Gomose ( <i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>P. nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> )	250 g/hL	Realizar as aplicações no período de crescimento ativo da árvore, logo que surjam os primeiros sintomas de gomose. Aplicar com 3 meses de intervalo reduzindo para 2 meses em casos graves.	15
	Míldio ou aguado <i>Phytophthora citrophthora</i> , <i>P. hibernalis</i> , <i>P. citricola</i> , <i>P. syringae</i> , <i>P. nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> )		Aplicar de novembro a fevereiro, desde que o tempo decorra frio e chuvoso. Caso seja necessário, repetir a aplicação com intervalos de 1 mês, respeitando o intervalo de segurança de 2 semanas.	15
Macieira e pereira	Podridão do colo e das raízes ( <i>Phytophthora cactorum</i> )		Efetuar pulverizações mensais desde que a folhagem seja suficiente para absorver o produto na quantidade adequada.	15
Marmeleiro*	Podridão das raízes ( <i>Phytophthora cinnamomi</i> )	250 g/hL	Efetuar pulverizações mensais, desde que a folhagem seja abundante para absorção do produto. Máximo de 3 aplicações.	**
Nespereira*			Efetuar no máximo 3 pulverizações até à plena floração, com um intervalo mínimo de 30 dias.	
Aveleira*, nogueira* e pistáchio*				

\* Extensão de autorização para utilizações menores. A eficácia e a fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

\*\* Não se aplica. Intervalo de segurança coberto pela época de aplicação (até à plena floração).

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não utilizar ALFIL WG em fruta destinada à transformação industrial.

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

### MODO DE APLICAÇÃO E VOLUME DE CALDA

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda: 800 a 1000 L/ha.

---

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

ALFIL WG é incompatível com produtos á base de óleos minerais, cobre e adubos foliares.

---

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

SP1 Não contaminar a água com o produto nem com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação do produto junto de águas superficiais. Evitar a contaminação através dos sistemas de esgoto de águas das explorações ou dos caminhos.

Na entrada de trabalhadores nas áreas tratadas durante as 24 horas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas e calças.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel. 800 250 250.

---

**EMBALAGENS**

Embalagens de 1 kg e 5 kg.

**ATENÇÃO**