

SUPER CAÏD®

Isco em grão de cereal (aveia) contendo 0,005% (p/p) de bromadiolona
Autorização de venda PT/DGS ARMPB-16/2015 concedida pela DGS

RODENTICIDA

USO DOMÉSTICO / NÃO PROFISSIONAL / PÚBLICO EM GERAL

CARACTERÍSTICAS E MODO DE ACÇÃO

SUPER CAÏD® é um rodenticida sob a forma de isco pronto a utilizar em grão de cereal (aveia descascada) contendo bromadiolona, uma cumarina anti-coagulante de 2.ª geração, que interrompe o ciclo da vitamina K e bloqueia a formação da protrombina. Os efeitos poderão ser observados 3 a 21 dias após a ingestão dos iscos pelos roedores.

SUPER CAÏD® é eficaz no combate à ratazana-dos-esgotos (*Rattus norvegicus*), ratazana-preta (*Rattus rattus*), rato-doméstico (*Mus musculus*), rato-do-campo (*Mus spretus*) e rato-silvestre (*Apodemus silvaticus*) - juvenis e adultos.

SUPER CAÏD® é apresentado em saquetas de 25g para aplicar em estações de isco a colocar no interior e ao redor de construções urbanas e rurais, edifícios industriais e comerciais e inclusivamente em áreas infestadas de quintas (junto a muros, paredes, etc.).

SUPER CAÏD contém Bitrex®, substância amargante para o paladar humano que ajuda a prevenir o envenenamento accidental. Bitrex® é uma marca registrada de Macfarlan Smith.

MODO DE EMPREGO

SUPER CAÏD® deve ser aplicado no interior de estações de isco, a serem colocadas nos locais frequentados pelos roedores de acordo com o nível de infestação.

Os locais mais indicados para colocar os pontos de iscos são os locais de passagem dos roedores, junto às paredes, nas entradas e saídas das tocas. Não utilizar o produto directamente nas tocas.

PRECAUÇÕES DE EMPREGO

Não abrir as saquetas.

O uso de luvas é recomendado em todas as etapas do tratamento. Lave as mãos depois de usar.

Os iscos devem ser colocados de um modo seguro de forma a evitar o seu consumo por crianças e animais não visados.

Não colocar em superfícies ou materiais que possam entrar em contacto com alimentos para evitar eventuais contaminações.

Colocar as estações de isco em locais protegidos da chuva e de inundações.

As estações de isco devem conter apenas o rodenticida.

Não limpar as estações de isco entre aplicações.

DOSES DE APLICAÇÃO

O número de iscos depende do nível de infestação e da área a tratar. As distâncias entre as estações de isco devem ser respeitadas.

Organismos alvo	Dose de aplicação	Distância entre as estações de isco		Controlo / Reabastecimento
		Baixa infestação	Elevada infestação	
Rato-doméstico Rato-do-campo	Até 50g (2 iscos) / estação de isco	A cada 2-3 m	A cada 1-1,5 m	Inspeccionar alguns dias após a 1ª aplicação. Controlar semanalmente. Reabasteça as estações sempre que for consumido parte do isco.
Rato-silvestre	Até 100g (4 iscos) / estação de isco	A cada 6 m	A cada 3 m	
Ratazanas	Até 200g (8 iscos) / estação de isco	A cada 8-10 m	A cada 4-5 m	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Sempre que for consumido parte do isco, reabasteça as estações de isco até à dose máxima indicada na tabela. Mantenha o abastecimento de isco fresco até que não haja vestígios da actividade dos roedores.

Durante o tratamento, tente recolher os roedores mortos a intervalos frequentes e regulares por motivos de higiene e para evitar que sejam ingeridos por outros animais. Eliminar os roedores mortos de acordo com a legislação em vigor.

O tratamento deverá durar 2 a 5 semanas, dependendo do nível de infestação.

Remover todo o isco após o tratamento e seguir as recomendações de eliminação.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P260 Não respirar as poeiras.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P314 Em caso de indisposição consulte um médico.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor

EFEITOS SECUNDÁRIOS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

A bromadiolona é um anticoagulante indirecto. Os seus efeitos resultam na inibição da coagulação sanguínea, com tendência para sangramento. Os sintomas de envenenamento podem incluir: aparecimento de equimoses ou hematomas, hemorragias nasais ou gengivais, sangue nas fezes ou na urina, sangramento excessivo decorrente de pequenos cortes ou abrasões.

Em caso de exposição, contactar imediatamente o Centro de Informação Antivenenos (Telef.:808 250 143) ou um médico.

Em caso de inalação: respirar ar fresco e descansar.

Se entrar em contacto com a pele: retirar a roupa contaminada. Lavar com sabonete e água abundantes. Não utilizar solventes ou diluentes.

Se entrar em contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água (tépida se possível) durante vários minutos.

Em caso de ingestão: contacte imediatamente um Centro de Informação Antivenenos ou um médico. Não provocar o vómito.

O antídoto adequado é a vitamina K1 ou fitomenadiona (sob supervisão médica).

EMBALAGENS

Embalagem de 200g (8 x 25g).