

RatKill®

Produto biocida (TP14 - Rodenticida)

Autorização N.º: PT/DGS trs-105/2020

Uso não profissional / Público em geral

Isco (pronto a usar) em pellets

0,0025% (25 mg/kg) de brodifacume (CAS 56073-10-0)



CARACTERÍSTICAS

RatKill® é um rodenticida destinado ao público em geral, para aplicação em áreas interiores de construções urbanas e rurais, assim como em exterior, ao redor de edifícios, para protecção da saúde pública e de produtos/materiais armazenados.

RatKill® apresenta-se formulado sob forma de isco (vermelho) em pellets, em saquetas individuais de 20 g, prontas a aplicar em estações de isco invioláveis. Contém brodifacume, um anticoagulante de 2ª geração de ingestão única e está indicado no combate ao Rato-doméstico (*Mus musculus*) e Ratazana-cinzenta (*Rattus norvegicus*) em todas as suas fases de desenvolvimento (adultos e juvenis).

RatKill® incorpora um composto amargante (benzoato de denatônio) para o paladar humano que ajuda a prevenir a ingestão acidental.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Considerar medidas de controlo preventivo (ex.: tapar buracos, remover possíveis fontes de alimentação e água) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinfestação. Remover todas as outras fontes de alimentação que estejam ao alcance dos roedores (ex. grãos soltos ou resíduos alimentares).

Não limpar a área infestada previamente ao tratamento, uma vez que tal perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.

Colocar o isco em estações de isco invioláveis adequadas. As estações de isco devem ser colocadas na proximidade dos locais onde foi observada actividade de roedores (ex. trilhos, ninhos, buracos, tocas, etc.).

Colocar as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia, animais de criação e outros animais não visados. Colocar as estações de isco afastadas de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.

Na utilização exterior ao redor dos edifícios, não colocar as estações de isco na proximidade de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em contacto com água.

MÉTODO, DOSE DE APLICAÇÃO E FREQUÊNCIA

Isco pronto a utilizar para aplicação em estações de isco invioláveis.

- **Rato-doméstico (Interior): até 20 g de isco por estação de isco.** Colocar as estações de isco a cada 5 metros no caso de um nível de infestação baixo. Em elevada infestação, a distância deve ser encurtada para 2 metros.

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se estão intactas e para remover os roedores mortos.

Se em algumas zonas o isco foi comido, aumentar a quantidade de isco, colocando mais estações de isco. Para ajudar ao programa de controlo, pode mover as estações de isco no momento em que os pontos de isco são inspeccionados.

Reabastecer o isco quando necessário. Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

- **Ratazanas (Interior e/ou exterior ao redor dos edifícios): até 60 g de isco por estação de isco.** Colocar as estações de isco a cada 10 metros no caso de um nível de infestação baixo. Em elevada infestação, a distância deve ser encurtada para 5 metros.

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 5 ou 7 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para remover os roedores mortos.

Não mova as estações de isco por vários dias após a colocação do isco. Caso não haja nenhum sinal de actividade das ratazanas próximo do isco após 7-10 dias, mover a estação de isco para uma área de maior actividade. Se todo o isco foi comido em certas áreas, aumente a quantidade de isco colocando mais estações de isco.

Reabastecer o isco quando necessário. Substituir o isco nas estações em que este tenha sido danificado por água ou contaminado por sujidade.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter a embalagem fechada e ao abrigo da luz solar.

Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

A validade do produto é de 24 meses após fabrico.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO RISCO

Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (ex. para prevenção de infestação ou para detectar actividade de roedores).

As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «Não mover ou abrir»; «Contém um rodenticida»; «RatKill»; «brodifacume» e «Em caso de incidente contactar o Centro de Informação Antivenenos (Tel. 800 250 250)».

Procurar e remover roedores mortos durante o tratamento, pelo menos, com a mesma frequência das inspecções às estações de isco.

Não tocar nos roedores mortos com as mãos nuas. Utilizar luvas ou ferramentas (ex. pinças). Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.

Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. Em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável actividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço profissional de controlo de pragas.

EFEITOS PROVÁVEIS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Este produto contém brodifacume, uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico / veterinário.

Em caso de:

- Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
- Exposição ocular, enxaguar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas, pelo menos 10 minutos.
- Exposição oral, lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto.

Contactar um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

ATENÇÃO



H373 Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.

P260 Não respirar poeiras.

P314 Em caso de indisposição, consulte um médico.

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem de acordo com a legislação em vigor.

UFI: J030-K0U5-C00Y-JGQX

EMBALAGENS

Embalagem de 140 g (7 x 20 g).

RatKill® é uma marca registada da EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda.