

FICHA TÉCNICA

KING® DUO



HC6 EC (nome comercial homologado)

Produto biocida TP18 – Inseticida / Uso profissional

Autorização nº PT/DGS ARMPB-59/2024

Titular da Autorização: Zapi S.p.A. - Itália

Concentrado para emulsão (EC) contendo 5,43% (p/p) de cipermetrina (CAS 52315-07-8) e 2,04% (p/p) de imidaclopride (CAS 138261-41-3)

Advertências de Perigo e Recomendações de Prudência

H319 Provoca irritação ocular grave.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P280 Usar luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS

KING® DUO (HC6 EC) é um inseticida bicomponente, contendo cipermetrina e imidaclopride, duas substâncias ativas que atuam no sistema nervoso dos insetos com diferentes modos de ação. Esta associação singular, numa formulação que utiliza coformulantes de última geração, apresenta um rápido efeito de choque e uma elevada eficácia residual.

KING® DUO (HC6 EC) destina-se ao controlo de insetos rastejantes, incluindo adultos e ninfas de barata-alemã (*Blattella germanica*), barata-oriental (*Blatta orientalis*), peixinho-de-prata (*Lepisma saccharina*) e formigas de jardim (*Lasius niger*), apresentando as seguintes vantagens:

- Ação inseticida rápida e eficaz;
- Ação sistémica e de contacto sobre os insetos-alvo;
- Proteção duradoura contra reinfestações.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilizar o produto apenas em espaços interiores, em superfícies de áreas restritas não sujeitas a limpeza com água (ex. porões, aberturas ou condutas de ventilação, caixas do sistema elétrico, fissuras e fendas entre móveis, ou onde os insetos se possam abrigar). A limpeza com água e/ou detergente das zonas tratadas interrompe o efeito biocida do produto.



FICHA TÉCNICA

KING® DUO

Aplicar somente na área infestada.

O produto não produz espuma, é de diluição fácil e rápida e normalmente não mancha as superfícies tratadas (sugere-se a realização de um teste prévio de compatibilidade em superfícies e artigos preciosos, de forma a verificar se não há formação de manchas ou auréolas).

Lavar as mãos após a aplicação do produto. Não comer, beber ou fumar.

O produto diluído não deve ser armazenado. Preparar uma nova diluição sempre que necessário.

Levar em consideração o ciclo de vida e as características dos insetos-alvo para adaptar os tratamentos. Em particular, visar o estágio mais suscetível da praga, o momento das aplicações e as áreas a serem tratadas.

Adotar métodos de gestão integrada de pragas como a combinação de métodos de controlo químico, físico e outras medidas de saúde pública, considerando as especificidades locais (condições climáticas, espécies-alvo, condições de utilização, etc.).

MÉTODO, DOSAGEM E FREQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

Agitar antes de usar. É aconselhável utilizar no dia da preparação.

Aplicar por pulverização a baixa pressão, nas seguintes dosagens:

- **Superfícies não porosas:** 50 mL/m² a 1 % (10 mL de produto diluído em 990 mL de água);
- **Superfícies porosas:** 50 mL/m² a 2 % (20 mL de produto diluído em 980 mL de água).

O atraso na ação é de cerca de 1 a 2 semanas. O efeito residual é de 4 semanas.

A frequência de aplicação é de até 11 aplicações por ano.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO RISCO

Não aplicar na proximidade de géneros alimentícios, rações, bebidas e em superfícies ou utensílios suscetíveis de entrarem em contacto direto com géneros alimentícios, rações, bebidas e animais.

É obrigatório o uso de proteção ocular durante o manuseamento do produto.

Utilizar luvas de proteção resistentes a produtos químicos (EN 374) durante o manuseamento do produto.

Usar vestuário de proteção química descartável, para evitar a emissão de resíduos para os esgotos por lavagem das roupas contaminadas.

O produto deve ser utilizado apenas em áreas inacessíveis a lactentes, crianças, animais de companhia e animais não visados.

Manter os gatos afastados das superfícies tratadas, devido à sua alta sensibilidade à toxicidade da cipermetrina.

Remover ou cobrir terrários, aquários e gaiolas de animais antes de aplicar o produto. Desligar o filtro de ar do aquário durante a pulverização.

FICHA TÉCNICA

KING® DUO



EFEITOS PROVÁVEIS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Os piretróides podem causar parestesia (ardor e formiguelo na pele, sem irritação). Se os sintomas persistirem: consulte um médico.

- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 5 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), tel. 800 250 250, ou um médico.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. Se os sintomas persistirem, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), tel. 800 250 250, ou um médico.
- EM CASO DE INALAÇÃO: se ocorrerem sintomas, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), tel. 800 250 250, ou um médico.
- EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), tel. 800 250 250, ou um médico.

UFI: JK2C-GOS3-2000-XHSY

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar num local seco e fresco. Manter a embalagem fechada e ao abrigo da luz solar direta.

O prazo de validade do produto é de 30 meses após data de fabrico.

EMBALAGENS

Embalagem de 100 mL.