

FICHA TÉCNICA

Raticume® DUO Pasta



DIAVLON PASTA FLUO (nome comercial homologado)

Produto biocida TP14 - Rodenticida / Uso profissional

Autorização n° PT/DGS ARMPB-74/2024

Titular da Autorização: Zapi S.p.A. - Itália

Isco (RB) pronto a usar com 0,0025% (p/p) bromadiolona (CAS 28772-56-7) e 0,0025% (p/p) difenacume (CAS 56073-07-5)

Advertências de perigo e Recomendações de Prudência

H360D Pode afetar o nascituro.

H373 Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização.

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

P280 Usar luvas de proteção.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P314 Em caso de indisposição, consulte um médico.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem de acordo com a legislação em vigor.



PERIGO

CARACTERÍSTICAS

Raticume® DUO Pasta (DIAVLON PASTA FLUO) é um rodenticida sob a forma de isco em pasta mole, de cor vermelha, em saquetas individuais de 10 g prontas a aplicar. Contém duas substâncias ativas anticoagulantes de 2ª geração, a bromadiolona e o difenacume, cuja associação confere ao produto uma ação muito eficaz no controlo de ratos e ratazanas, em todas as fases de desenvolvimento.

O produto apresenta as seguintes características inovadoras:

- Patente Europeia n° 2 090 164 B1: associação sinérgica de duas substâncias ativas anticoagulantes.
- Tecnologia FLUO-NP® (pigmento fluorescente): o isco pode ser facilmente identificado em condições de pouca luminosidade, através de luz UV. Quando ingerido, torna os excrementos visíveis sob luz UV, possibilitando a monitorização da atividade dos roedores.
- Formulação PASTA PLUS: combina farinha-láctea, açúcar e gorduras enriquecidas com cereais numa mistura muito atrativa para os roedores.

E incorpora na sua formulação um composto amargo (*benzoato de denatônio*) para o paladar humano, para prevenir a ingestão accidental.

Raticume® DUO Pasta (DIAVLON PASTA FLUO) destina-se ao controlo de roedores em espaços interiores e no exterior, ao redor de edifícios. Devido à sua palatabilidade, é particularmente indicado para aplicar em áreas onde exista uma grande presença de géneros alimentícios (ex. indústria agroalimentar, armazéns, hotéis, restaurantes, bares, etc.). Também pode ser aplicado no interior de estações de distribuição de energia e em meios de transporte.

FICHA TÉCNICA

Raticume® DUO Pasta



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Efetuar uma inspeção preliminar à área infestada a fim de identificar as espécies de roedores, os locais de atividade, determinar a causa provável e a dimensão da infestação.

Remover todas as fontes de alimentação que estejam ao alcance dos roedores (ex. grãos soltos, resíduos alimentares...). Não limpar a área infestada previamente ao tratamento, uma vez que perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.

Não abrir as saquetas que contêm o isco. Colocar as saquetas em estações de isco invioláveis, a colocar na proximidade dos locais onde foi observada atividade de roedores (ex. trilhos, ninhos, buracos, etc.).

Colocar as estações de isco: fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia, animais de criação e outros animais não visados; e afastadas de gêneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.

No caso de utilização exterior, ao redor dos edifícios, proteger o isco das condições atmosféricas. Não colocar as estações de isco áreas sujeitas a inundações, nem na proximidade de sistemas de drenagem de águas pluviais. Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.

Usar luvas de proteção (EN 374) durante o manuseamento do produto. Não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta depois de manusear o produto.

Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. Findo este período de tratamento, se os iscos continuarem a ser consumidos e não se registar um declínio na atividade dos roedores, a causa provável deve ser determinada. Nos casos em que tenham sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, pelo que deve ser considerada a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se possível, ou de um rodenticida anticoagulante mais potente. Em caso de suspeita de falta de eficácia, o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contratar um serviço de controlo de pragas.

Remover o isco restante e as estações de isco no final do período de tratamento.

MÉTODO, DOSAGEM E FREQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

Isco (pronto a usar) para aplicação em estações de isco invioláveis.

- **Rato-doméstico** (interior e exterior ao redor de edifícios): até **50 g** de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, colocar as estações de isco a cada 5 metros. Em caso de elevada infestação, a distância deve ser reduzida para 2 metros.
As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se estão intactas e para remover os roedores mortos. Reabastecer com isco quando necessário.
- **Ratazanas** (interior e exterior ao redor de edifícios): até **100 g** de isco por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, colocar as estações de isco a cada 10 metros. Em caso de elevada infestação, a distância deve ser reduzida para 5 metros.
As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 5 ou 7 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para remover os roedores mortos. Reabastecer com isco quando necessário.



FICHA TÉCNICA

Raticume® DUO Pasta

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO RISCO

Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos durante o tratamento. Não tocar nos roedores mortos com as mãos nuas. Utilizar luvas ou ferramentas (ex. pinças). Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.

As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «não mover ou abrir»; «contém rodenticida»; «bromadiolona e difenacume» e «Em caso de incidente contactar o Centro de Informação Antivenenos (Tel. 800 250 250)». Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (ex. para prevenção de infestações ou para detetar atividade de roedores).

EFEITOS PROVÁVEIS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Este produto contém bromadiolona e difenacume, duas substâncias anticoagulantes. Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.

Em caso de:

- Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
- Exposição ocular, enxaguar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas, pelo menos 10 minutos.
- Exposição oral, lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto.

Contatar o Centro de Informação Antivenenos (Tel. 800 250 250) para obter aconselhamento / UFI: 0A20-M043-J00U-HJFH

Contactar um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar num local seco e fresco. Manter a embalagem fechada e ao abrigo da luz solar direta.

Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação.

A validade do produto é de 18 meses após data de fabrico.

EMBALAGENS

Embalagens de 1,5 kg (150x10g) e 10 kg (1000x10g).