

# GARDENTOP® STRIKE PF

Produto biocida (TP14 - Rodenticida)  
 Categoria de utilizador: Público em geral (não profissional)  
 Autorização nº PT/DGS adc 23/2025  
 Isco (pronto a usar) em pasta  
 0,0017% (p/p) brodifacume (CAS 56073-10-0)  
 Incorpora um agente amargo (benzoato de denatônio)



## CARACTERÍSTICAS

**GARDENTOP® STRIKE PF** é um isco na forma de pasta mole (vermelha fluorescente) em saquetas individuais de 15g prontas a aplicar. Contém brodifacume, um composto altamente eficaz de ingestão única, que proporciona o controlo total das populações de roedores, eliminando todas as resistências conhecidas. Está indicado no controlo do rato-doméstico (*Mus musculus*), ratazana-castanha (*Rattus norvegicus*) e ratazana-preta (*Rattus rattus*), em todas as fases de desenvolvimento (adultos e juvenis).

A formulação de **GARDENTOP® STRIKE PF** combina 5 características especiais:

- Uma mistura de farinhas de cereais (aveia, trigo e milho) para maximizar a palatabilidade da pasta;
- Uma combinação de óleos altamente palatáveis para garantir que a textura da pasta permanece macia;
- Fórmula PASTA PLUS: mistura enriquecida com cereais integrais, especialmente atrativos para as espécies de roedores mencionadas;
- Um sistema conservante que mantém os iscos estáveis e sem deterioração durante mais tempo;
- Tecnologia FLUO-NP: um aditivo especial (pigmento fluorescente) que atrai os roedores, torna o isco facilmente identificável mesmo em condições de pouca luminosidade, e quando ingerido, torna os excrementos dos roedores visíveis sob luz UV, possibilitando a monitorização da sua atividade.

Devido à sua grande palatabilidade, o isco em pasta é extremamente versátil, e é indicado para o uso em áreas residenciais onde exista uma grande presença de géneros alimentícios, no interior de edifícios e ao seu redor.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Remover todas as outras fontes de alimentação que estejam ao alcance dos roedores (ex. grãos soltos ou resíduos alimentares). Não limpar a área infestada previamente ao tratamento, uma vez que tal perturba a população de roedores e torna mais difícil a aceitação do isco.

Não abrir as saquetas que contêm o isco. Colocar o isco em estações de isco adequadas. As estações de isco devem ser colocadas na proximidade dos locais onde foi observada atividade de roedores (ex. trilhos, ninhos, buracos, tocas, etc.).

Colocar as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia, animais de criação e outros animais não visados. Colocar as estações de isco afastadas de géneros alimentícios, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contacto com os mesmos.

Na utilização exterior ao redor dos edifícios, não colocar as estações de isco na proximidade de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em contacto com água. Se possível, as estações de isco devem ser fixadas ao solo ou a outras estruturas.

Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes após o consumo do isco. Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. Em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, ainda é observável atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas.

## MÉTODO, DOSE DE APLICAÇÃO E FREQUÊNCIA

Isco pronto a utilizar para aplicação em estações de isco invioláveis.

- **Rato-doméstico (interior): 30-50g** por ponto de isco. Colocar as estações de isco a cada 5 metros no caso de um nível baixo de infestação. Em elevada infestação, a distância deve ser encurtada para 2 metros.  
As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se estão intactas e para remover os roedores mortos. Reabastecer o isco quando necessário.
- **Ratazanas (interior e exterior ao redor dos edifícios): 60-80g** por ponto de isco. Colocar as estações de isco a cada 10 metros no caso de um nível baixo de infestação. Em elevada infestação, a distância deve ser encurtada para 5 metros.  
As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 5 ou 7 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para remover os roedores mortos. Reabastecer o isco quando necessário.

---

## ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Armazenar o produto a temperaturas abaixo de 35°C. Manter a embalagem fechada e ao abrigo da luz solar direta.

Armazenar em locais inacessíveis a crianças, pássaros, animais de companhia e animais de criação. Não armazenar perto de alimentos, bebidas e rações.

A validade do produto é de 2 anos após data de fabrico.

---

## MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO RISCO

Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (ex. para prevenção de infestação ou para detetar atividade de roedores).

As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «Não mover ou abrir»; «contém um rodenticida»; «GARDENTOP STRIKE PF - Autorização: PT/DGS adc 23/2025»; «Substância ativa: brodifacume» e «Em caso de incidente contactar o Centro de Informação Antivenenos (Tel. 800 250 250)».

Procurar e remover roedores mortos durante o tratamento, pelo menos, com a mesma frequência das inspeções às estações de isco.

Não tocar nos roedores mortos com as mãos nuas. Utilizar luvas ou ferramentas (ex. pinças). Eliminar os roedores mortos em conformidade com os requisitos locais.

---

## EFEITOS PROVÁVEIS E INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Este produto contém brodifacume, uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico / veterinário.

Em caso de:

- Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
- Exposição ocular, enxaguar os olhos com água ou solução para lavar os olhos, manter as pálpebras abertas, pelo menos 10 minutos.
- Exposição oral, lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto.

Contactar um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

---

## ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

O produto não é classificado como perigoso segundo o Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP].

---

## EMBALAGENS

150 g (10x15g)